



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

HEPATITA CRONICA

CAUZE, MANIFESTARI SI OPTIUNI DE TRATAMENT

Se estimeaza ca, la nivel mondial, sute de milioane de persoane traiesc cu hepatita cronica, o afectiune ale carei simptome nu sunt intotdeauna vizibile si care, nefrata, creste riscul dezvoltarii unor boli grave precum ciroza sau cancerul hepatic.

Ce este hepatita cronica?

Hepatita este o inflamatie a ficatului, provocata, cel mai adesea, de infectia cu un virus hepatic. Atunci cand aceasta inflamatie dureaza mai mult de 6 luni vorbim despre hepatita cronica. Mai putin comună decat hepatita acuta, poate persista chiar si zeci de ani, fara a provoca neaparat daune majore ficatului. In unele cazuri insa, aceasta inflamatie duce la ciroza, insuficienta hepatica si uneori chiar la cancer de ficat.

Există mai multe tipuri de hepatita cronica, in functie de etiologie, intensitatea inflamatiei histologice si a necrozei, precum si a gradului de fibroza histologica. In functie de etiologie, de exemplu, se poate vorbi despre:

- hepatita cronica toxica nutritionala;
- hepatita cronica virală;
- hepatita cronica autoimuna.

O alta denumire pe care ai putea-o auzi este cea de hepatita cronica nespecificata. Daca te intrebi ce este hepatita cronica nespecificata, aceasta



UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA
IAȘI


ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON
IAȘI



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

denumire este folosita atunci cand au fost excluse cauze precum cele mentionate mai sus si nu exista inca suficiente informatii pentru a specifica o cauza.

Hepatita cronica: cauze si factori de risc

Cauzele hepatitei cronice sunt numeroase si variate, de la anumite virusuri pana la medicamente sau consumul de alcool.

Cele mai frecvente cauze ale hepatitei cronice sunt:

- Virusul hepatitei C - cauzeaza aproximativ 60 pana la 70% din cazurile de hepatita cronica; cel putin 75% dintre cazurile de hepatita C acuta se cronicizeaza;
- Virusul hepatitei B - 5 pana la 10% dintre cazuri devin cronice; in cazul copiilor, procentul este mult mai ridicat: hepatita B acuta se cronicizeaza la pana 90% dintre nou-nascutii infectati, respectiv pana la 50% dintre copiii mici;
- Steatohepatita nealcoolica - este un tip de inflamatie cronica a ficatului ce apare, de obicei, la persoanele cu obezitate, diabet si/sau niveluri anormale de colesterol sau alte grasimi in sange;
- Boala hepatica legata de alcool - apare, de regula, la persoanele care consuma alcool in exces timp de mai multe luni sau ani.

Alte posibile cauze ale hepatitei cronice sunt:

- hepatita autoimuna;
- administrarea prelungita a anumitor medicamente;
- deficitul de alfa-1 antitripsina (o tulburare ereditara);
- boala celiaca;
- hemocromatoza (o tulburare ereditara care determina organismul sa absoarba prea mult fier);



UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA
IAȘI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON
IAȘI



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

- colangita biliară primară;
- tulburările glandei tiroide;
- boala Wilson (o afecțiune ereditată rară) - la copii și adulți tineri.

Factori de risc

Riscul de a dezvolta hepatita cronica este influențat de anumiti factori. În general, riscul de a face hepatita este mai ridicat în randul celor care:

- Consumă sau folosesc în viața de zi cu zi apă nesigură;
- Intră în contact cu ace, seringi sau alte obiecte contaminate cu sânge infectat cu virusuri hepatici;
- Nu se protejează în timpul contactelor sexuale și au mai mulți parteneri;
- Sunt expuși la substanțe chimice toxice frecvent;
- Consumă alimente care nu au fost spălate sau pregătite corespunzător;
- Consumă cantități mari de alcool o perioadă lungă;
- Iau anumite medicamente.

Cum se manifestă hepatita cronica? Care sunt simptomele?

De multe ori, hepatita cronica se dezvoltă treptat, fiind asimptomatică.

Atunci când apar, simptomele hepatitei cronice pot include:

- stare generală proastă;
- pierderea apetitului;
- obosalea;
- febra usoară;
- disconfort abdominal.



UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA
IAȘI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON
IAȘI



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Se intampla des ca primele simptome specifice sa apară abia atunci cand deja s-a dezvoltat ciroza. În acest caz, pot fi prezente simptome precum:

- splina marita;
- angioame paianjen (mici vase de sange vizibile la nivelul pielii);
- înrosirea palmelor;
- ascita (acumularea de lichid în abdomen);
- coagulopatie (tendința de sangerare);
- sangerari în tractul digestiv;
- icter (îngalbenirea pielii și a albului ochilor);
- encefalopatie hepatică (deteriorarea funcției cerebrale);
- cancer hepatic.

Sимптомы могут варьировать в зависимости от причины хронического гепатита. Например, хронический аутоиммунный гепатит может вызвать симптомы, такие как прерывание менструации, боли в суставах, потеря аппетита, диарея.

Cum se diagnosticheaza hepatita cronica?

De obicei, procesul de diagnosticare a hepatitei cronice incepe cu analize de sange pentru masurarea nivelurilor enzimelor hepatici și ale altor substanțe produse de ficat. Ce analize se fac pentru hepatita cronica depinde și de cauza suspectată; de exemplu, dacă nu este identificat niciun virus hepatic, vor fi necesare alte analize de sange pentru depistarea altor posibile cauze. Pentru confirmarea diagnosticului se mai pot efectua: biopsie hepatică și teste imagistice specializate (ex: elastografia cu ultrasunete, elastografia prin rezonanță magnetică).



UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA
IAȘI


ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON
IAȘI



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Cum se trateaza hepatita cronica?

Tratamentul hepatitei cronice se concentreaza pe tratarea cauzei si gestionarea complicatiilor.

In cazul hepatitei cronice toxice indusa de medicamente, de exemplu, se va intrerupe administrarea medicamentelor respective. Daca hepatita cronica alcoolica este cauza, medicii recomanda schimbarea stilului de viata si, bineintelese, renuntarea la consumul de alcool.

Nu exista tratament pentru hepatita B, dar se pot administra medicamente antivirale daca se agraveaza sau daca nivelurile enzimelor hepatice ori incarcatura virală sunt foarte mari.

Tratamentul hepatitei cronice C presupune administrarea de medicamente antivirale timp de 8 pana la 24 de saptamani.

In cazul hepatitei cronice cauzata de steatohepatita non-alcoolica, tratamentul poate include pierderea in greutate, adoptarea unei diete sanatoase, administrarea unumitor medicamente si evitarea toxinelor.

Hepatita autoimuna se trateaza, de obicei, cu corticosteroizi si alte medicamente care pot suprima sistemul imunitar si ameliora simptomele.

Complicatiile hepatitei cronice

Daca nu este tratata, hepatita cronica poate duce la ciroza, insuficienta hepatica si creste riscul de cancer hepatic. Diagnosticarea si tratarea la timp a hepatitei cronice poate ajuta insa la prevenirea acestor complicatii.

Cum poate fi prevenita hepatita cronica?

Cea mai buna modalitate de a reduce riscul dezvoltarii hepatitei cronice este de a lua masuri, atunci cand este posibil, pentru a preveni hepatita. Exista, de



UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA
IAȘI

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON
IAȘI



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

exemplu, vaccin pentru hepatita B, iar hepatita alcoolica poate fi prevenita prin evitarea consumului excesiv de alcool. Hepatita autoimuna, pe de alta parte, nu poate fi prevenita.

Acet material a fost realizat în cadrul proiectului "Program regional de prevenire, depistare precoce (*screening*), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatiche cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatiche B/D și C din regiunile Nord-est și Sud-est - LIVE(RO)2 - EST" POCU/755/4/9/136209, Cod SMIS: 136209 implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași în calitate de beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Communication Specialist - Prof. univ. dr. Carol Stanciu

Expert monitorizare acțiuni informare/educare regiunea SE - Asist. univ. dr. Laura Huiban

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Str. Universității nr. 16, 700115, Iași, România

www.umfiasi.ro

Manager proiect,

Prof. Dr. Anca Victorița TRIFAN

Email: proiecte.europene@umfiasi.ro



UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ ȘI FARMACIE
GRIGORE T. POPA
IAȘI


ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN
DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON
IAȘI