



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

## ÎNTREBĂRI FRECVENTE DESPRE COVID-19 ȘI HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C

O dată cu pandemia COVID-19 s-au ridicat numeroase întrebări cu privire la modul în care această infecție nou apărută ar putea afecta persoanele cu hepatită cronică virală C. Expunem mai jos câteva din răspunsurile noastre.

### *1. Vaccinarea anti-COVID-19 și hepatita C*

#### **Am hepatita C, ar trebui să fiu îngrijorat în legătură cu vaccinul anti-COVID?**

Nu. Nu există motive de îngrijorare cu privire la administrarea vaccinurilor anti-COVID. Nu există dovezi care să sugereze că vaccinurile anti-COVID au un impact negativ asupra unei persoane care are hepatita C sau care a avut hepatita C.

#### **Primesc tratament antiviral pentru hepatita C, ar trebui să fiu îngrijorat de vaccinul anti-COVID?**


Nu. Nu există nici un motiv să fiți îngrijorat de vaccinul anti-COVID dacă urmați tratament antiviral împotriva virusului C. Cu siguranță ar trebui să continuați să luați tratamentul pentru a avea cele mai mari șanse de vindecare.

#### **Am ciroză hepatică, ar trebui să primesc vaccinul anti-COVID?**

Da. Vaccinurile anti-COVID-19 sunt sigure și recomandate persoanelor cu ciroză hepatică. Administrarea unui vaccin anti-COVID-19 poate fi deosebit de importantă pentru persoanele cu ciroză hepatică care prezintă un risc crescut de boală gravă în caz de infecție cu COVID-19.

#### **Am făcut un transplant de ficat, ar trebui să primesc vaccinul anti-COVID-19?**

Da. Persoanele care au avut un transplant de ficat și care iau imunosupresoare pot și ar trebui să primească vaccinul anti-COVID. Vaccinul este sigur și eficient. Persoanele care au



suferit un transplant de ficat sunt deosebit de vulnerabile la forme grave în cazul infecției cu COVID-19 și, prin urmare, sunt încurajați să primească vaccinul atunci când li se oferă.

### **Vaccinul antigripal mă protejează împotriva infecției cu COVID-19?**

Vaccinul antigripal nu vă va ajuta să vă protejați împotriva COVID-19, dar vă poate proteja împotriva celor mai frecvente tulpini de gripă din acest sezon care vine. Având gripă și COVID-19 este potențial periculos, deci recomandăm cu tărie vaccinarea împotriva gripei.

## **2. Hepatita C și infecția cu COVID-19**

### **Am hepatita C, am un risc mai mare de infecție cu COVID-19?**

Nu. Nu există dovezi că persoanele care trăiesc cu hepatita C prezintă un risc mai mare de infecție cu COVID-19. Urmați sfaturile guvernului privind păstrarea în siguranță și oprirea răspândirii COVID-19.

### **Am hepatita C, am un risc mai mare de boală severă din cauza COVID-19?**

Nu. Nu există dovezi care să arate că hepatita C vă expune unui risc mai mare de boală severă din cauza COVID-19. Hepatita C nu este menționată ca o afecțiune de sănătate care poate contribui la o formă mai severă a infecției cu COVID-19.

### **Am hepatita C, trebuie să iau măsuri de precauție suplimentare împotriva COVID-19?**

Luați aceleași precauții ca toate celelalte persoane. Cu toții trebuie să luăm măsuri de precauție pentru a opri răspândirea COVID-19, indiferent dacă avem hepatita C sau nu, pentru sănătatea noastră și pentru comunitatea noastră în ansamblu. Ar trebui să luați măsuri de precauție suplimentare pentru a vă proteja de COVID-19 dacă aveți peste 70 de ani, aveți comorbidități asociate sau aveți un sistem imunitar slăbit.

### **Sunt vindecat de hepatita C, sunt încă în pericol de infecție cu COVID-19?**

Nu. Nu există nicio dovadă că persoanele vindecate de hepatita C prezintă un risc mai mare de infecție cu COVID-19 sau de a fi grav bolnavi dacă o primesc. Acest lucru se întâmplă doar dacă aveți și o afecțiune cronică, aveți peste 70 de ani sau aveți un sistem imunitar slăbit.



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

### 3. *Tratamentul hepatitei C și infecția COVID-19*

#### **Am vorbit cu medicul meu despre tratamentul hepatitei C, ar trebui să aștept până se termină pandemia pentru a începe acest tratament?**

Cel mai bun moment pentru a începe tratamentul hepatitei C depinde de dvs. Cu excepția cazului în care aveți leziuni hepatice semnificative, tratamentul hepatitei C poate aștepta câteva săptămâni pe măsură ce navigăm în această pandemie - vă rugăm să discutați mai mult cu medicul dumneavoastră despre aceasta. Vă recomandăm cu siguranță să începeți tratamentul mai devreme decât mai târziu, astfel încât să puteți fi vindecați și să trăiți fără hepatita C, precum și să reduceți orice risc de leziuni hepatice grave dacă virusul C este lăsat netratat.

#### **Ar trebui să continui tratamentul hepatitei C în acest timp?**

Da. Cu siguranță continuați să luați tratamentul hepatitei C. Încetați să luați tratamentul numai dacă medicul dumneavoastră vă spune acest lucru. Dacă întrerupeți tratamentul, virusul hepatitic C va deveni mai rezistent și există riscul de a nu fi vindecat de acest virus.

#### **Tratamentul pentru virusul hepatitic C mă va expune unui risc mai mare pentru infecția cu COVID-19? Sistemul meu imunitar este slăbit de tratament?**


Nu. Nu există dovezi că tratamentul pentru hepatita C vă afectează sistemul imunitar sau vă fac să fiți mai expuși riscului de a contacta COVID-19. Medicamentele antivirale atacă direct virusul hepatitic C; acestea nu au nici un impact asupra sistemului imunitar.

#### **Tratamentul antiviral îmi oferă protecție împotriva COVID-19?**

Nu există dovezi care să sugereze că tratamentul antiviral are un efect împotriva COVID-19.

#### **Rămân fără comprimate pe perioada tratamentului antiviral, dar îmi fac griji că trebuie să merg la farmacie. Pot să iau un comprimat la câteva zile?**

Nu. Cu siguranță continuați să luați tratamentul antiviral normal, cu excepția cazului în care medicul dumneavoastră vă recomandă să nu o faceți. Este foarte important să continuați să luați tratamentul antiviral normal ca să aveți cele mai mari șanse de a vă vindeca.





UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale  
2014-2020

Farmaciile sunt un serviciu esențial și vor rămâne deschise. Sunați la farmacie pentru a vedea dacă acestea livrează sau vă pot ajuta să vă faceți vizita rapid și sigur. De asemenea, este posibil să puteți apela la un prieten sau un membru al familiei să vă ia medicamentele pentru dvs.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului ”Program regional de prevenire, depistare precoce (*screening*), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-est și Sud-est - LIVE(RO)2 - EST” POCU/755/4/9/136209, Cod SMIS: 136209 implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași în calitate de beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Communication Specialist - Prof. univ. dr. Carol Stanciu

Expert monitorizare acțiuni informare/educare regiunea SE – Asist. univ. dr. Laura Huiban

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Str. Universității nr. 16, 700115, Iași, România

[www.umfiasi.ro](http://www.umfiasi.ro)

Manager proiect,

Prof. Dr. Anca Victorița TRIFAN

Email: [proiecte.europene@umfiasi.ro](mailto:proiecte.europene@umfiasi.ro)

