



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

Importanța screening-ului hepatitelor virale

Este important ca toți pacienții infectați cu virusul hepatitei virale B sau C să știe de această problemă și să fie luate toate măsurile terapeutice necesare. Diagnosticul însă nu poate aștepta apariția simptomelor. Marea majoritate a celor infectați nu au niciun simptom sau au manifestări nespecifice minore (ex. astenie) nebăgate în seamă de către aceștia. Deci, nu ne putem baza ca o persoană infectată va fi forțată de simptomele bolii să se prezinte la medic. Când acest lucru se întâmplă, adică pacientul este nevoit din cauza bolii să se prezinte la medic (apariția icterului, ascitei, hemoragiei digestive variceale, encefalopatiei hepatice) afecțiunea produsă de infecția virală cronică este avansată, de cele mai multe ori în stadiul de ciroză hepatică decompensată, când intervenția terapeutică are rezultate neglijabile.

Așadar, infecția trebuie descoperită când pacienții nu au simptome, când afectarea ficatului sau a altor organe (ex. rinichi) este minimă și intervenția terapeutică are impact major asupra evoluției ulterioare a pacientului. Modalitatea de diagnostic a infecției într-o populație asimptomatică se numește screening.

Diagnosticarea precoce prin screening populațional a tuturor persoanelor infectate cu virus B și C are consecințe deosebite atât la nivel personal, pentru pacient, cât și la nivel populațional:

1. Diagnostic precoce, în stadii scăzute de fibroză sau măcar în faza de ciroză compensată;
2. Stadializare completă, inițierea tratamentului antiviral pentru persoanele eligibile pentru tratament;
3. Oprirea evoluției fibrozei la majoritatea pacienților cu răspuns virusologic susținut în cazul hepatitei C sau supresie virală susținută în cazul hepatitei B;
4. Scăderea ratei de decompensare hepatică în cazul cirozelor compensate;
5. Tratamentul corect al complicațiilor bolii în cazurile avansate;
6. Scăderea ratei de apariție a cancerului hepatocelular (complicație redutabilă a cirozei hepatice virale);
7. Diminuarea afecțiunilor extrahepatice relaționate cu infecțiile virale;



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON - IAȘI



UNIUNEA EUROPEANĂ



Instrumente Structurale
2014-2020

8. Micșorarea mortalității prin ciroză hepatică în viitorii ani;
9. Diminuarea mortalității prin cancer hepatic;
10. Diminuarea rezervorului de virus B și C și consecutiv a transmiterii intrafamiliale a infecției virale B și C;
11. Diminuarea costurilor pentru îngrijirea bolilor hepatice terminale;
12. Educarea populației pentru un stil de viață sănătos, protectiv pentru bolile cronice.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului ”Program regional de prevenire, depistare precoce (*screening*), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C din regiunile Nord-est și Sud-est - LIVE(RO)2 - EST” POCU/755/4/9/136209, Cod SMIS: 136209 implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași în calitate de beneficiar, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Communication Specialist - Prof. univ. dr. Carol Stanciu

Expert monitorizare acțiuni informare/educare regiunea SE - Asist. univ. dr. Laura Huiban

Expert monitorizare acțiuni informare/educare regiunea NE - Ivona Burduja

PR Executive - Niculina Lupascu

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

Str. Universității nr. 16, 700115, Iași, România

www.umfiasi.ro

Manager proiect,

Prof. Dr. Anca Victorița TRIFAN

Email: livero2@umfiasi.ro



ASOCIAȚIA ROMÂNĂ ANTI-SIDA
A.R.A.S.

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ
SF. SPIRIDON - IAȘI